


# POZOROVÁNÍ PTÁKŮ

## STRAKA OBECNÁ *Pica pica*

Datum pozorování: 8. 11. Místo pozorování: Modřanská rokle

Straka obecná je **krkavcovitý pěvec velikosti hrdličky**, s výrazným **černobílým zbarvením a dlouhým stupňovitým ocasem**. Má poměrně krátká a široká křídla a její let je ve srovnání s jinými krkavcovitými těžkopádný.

velikost: asi jako **holub**  
 způsob pohybu: **letání**  
 ocas: **dlouhý, rovný**  
 zobák: **silnější**



Říše: **živočichové (Animalia)**  
 Kmen: **strunatci (Chordata)**  
 Třída: **ptáci (Aves)**  
 Podtřída: **letci (Neognathae)**  
 Řád: **pěvci (Passeriformes)**  
 Čeleď: **krkavcovití (Corvidae)**  
 Rod: **straka (Pica)**

**Zbarvení:** Černá je hlava, horní část hřbetu, krk, vole, ocas, valná většina křídla. Bílá jsou prsa a břicho, lopatky, dolní část hřbetu, kostřec a vnitřní prapory ručních letek. Černé části křídel a rýdovací pera nejsou opravdu černá. Jak je vidět na jedincích v letu a ve slunečním svitu ocas se leskne do zelená a křídla do modra.

Počet jedinců, které jsem pozorovala: **1**



## KACHNA DIVOKÁ *Anas platyrhynchos*

Místo pozorování: Modřanská rokle

Datum pozorování: 8. 11.


Kachna divoká zvaná také březňačka, je pták z čeledi **kachnovitých**. Patří mezi **ekologicky nejúspěšnější druhy ptáků**, který se byl schopen naprosto přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám. Je **největší plovavou kachnou žijící v Česku**. Z kachny divoké byla později vyšlechtěna kachna domácí.

Říše: **živočichové (Animalia)**  
 Kmen: **strunatci (Chordata)**  
 Třída: **ptáci (Aves)**  
 Podtřída: **letci (Neognathae)**  
 Řád: **vrubozobí (Anseriformes)**  
 Čeleď: **kachnovití (Anatidae)**  
 Rod: **kachna (Anas)**

velikost: asi jako **havran**  
 způsob pohybu: **plavání**  
 ocas: **kratší**  
 zobák: **dlouhý, plochý**

**Zbarvení:** Výrazným pohlavním dimorfismem, kdy samička není tak pestře zbarvena jako sameček a má hnědočerné ochranné zbarvení. Jediné nápadné místo je na zadním okraji křídel, které odpovídá samčímu. Kačer se od kachny liší hlavně výrazným zbarvením, které je nejvýraznější na hlavě a krku, které bývají tmavě zeleně lesklé, zobák je zelenožlutý. Jinak je samec sivý, s hnědou hrudí. Na zadním okraji křídel má kovovomodrobílý lemovaný pás.

Počet jedinců, které jsem pozorovala: **3**



## LABUŤ VELKÁ *Cygnus olor* Datum pozorování: 8. 11.

Místo pozorování: Modřanská rokle - Náplavka - Rašínovo nábřeží

velikost: asi jako **větší jak havran**  
 způsob pohybu: **plavání**  
 ocas: **krátký**  
 zobák: **dlouhý, zploštělý**



Říše: **živočichové (Animalia)**  
 Kmen: **strunatci (Chordata)**  
 Třída: **ptáci (Aves)**  
 Podtřída: **letci (Neognathae)**  
 Řád: **vrubozobí (Anseriformes)**  
 Čeleď: **kachnovití (Anatidae)**  
 Rod: **labuť (Cygnus)**

**Zbarvení:** Má dlouhé, bílé zbarvené tělo s krátkým ocasem, černýma nohama a dlouhým, štíhlým krkem, který nese při plavání buď vzpřímený, nebo mírně esovitě prohnutý. Zobák je oranžový s černým nehtem na špičce; u kořene přechází v černé ozobí s výrazným hrbolem, který je u samce viditelně větší než u samice.

Počet jedinců, které jsem pozorovala: **2**

