

Pozorování ptáků

Lyska černá

Lyska černá je středně velký plovavý pták široce rozšířený na velkém území Eurasie, v Indonésii, Austrálii a severní Africe.

Fulica atra



datum: 7. listopadu 2020
místo pozorování: Humpolec (Plačkov) lesy na Vysočině
velikost ptáka: lyska je veliká jako havran
způsob pohybu: plavání
tvar těla: tvarem těla připomíná kachnu
vzhled: lesklé černé peří, bílý zašpičatělý čelní štítek, červené oči
ocas: krátký
zobák: krátký, zašpičatělý
počet pozorovaných jedinců: 4

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovcí (Vertebrata)
Třída: ptáci (Aves)
Podtřída: letci (Neognathae)
Řád: krátkokřídlí (Gruiformes)
Čeleď: chřástalovití (Rallidae)
Rod: lyska (Fulica)

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka patří mezi naše nejznámější a také nejhojnější ptáky.

Cyanistes caeruleus



datum: 7. listopadu 2020
místo pozorování: Humpolec (Plačkov) lesy na Vysočině
velikost ptáka: Sýkora je velká jako vrabec.
způsob pohybu: letání
tvar těla: tvarem těla připomíná vrbce
vzhled: Má modré temeno a černý proužek přes oko. Hlava je bílá, hřbet a kostřec olivově zelený a křídla modrá s úzkou bílou páskou. Spodina je žlutá s úzkým šedočerným středovým pruhem, ocas modrý bez bílého zbarvení. Nohy jsou tmavě modrošedé, oči hnědé.
ocas: delší, rovny
zobák: krátký, zašpičatělý
počet pozorovaných jedinců: 3

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovcí (Vertebrata)
Třída: ptáci (Aves)
Podtřída: letci (Neognathae)
Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: sýkorovití (Paridae)
Rod: sýkora (Cyanistes)

Strakapoud velký

Strakapoud velký je široce rozšířený šplhavec z čeledi datlovitých.

Dendrocopos major



datum: 7. listopadu 2020
místo pozorování: Humpolec (Plačkov) lesy na Vysočině
velikost ptáka: strakapoud velký má velikost podobnou jako kos
způsob pohybu: šplhání, létání
tvar těla: tvarem těla připomíná datla
vzhled: Je převážně černý s výraznými bílými znaky na křidlech v podobě velké skvrny na jejich vrchní části a tenkých světlých pruhů na letkách. Spodina těla má lehce nažloutlou, opeření na spodních krovkách ocasních oranžovo-červené. Na boční straně jinak světlé hlavy má dva výrazné, ve středu spojené tmavé pruhy.
ocas: tuhá ocasní pera (slouží jako opora těla)
zobák: silný, zašpičatělý (přizpůsoben k rozbití dřeva)
počet pozorovaných jedinců: 1

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovcí (Vertebrata)
Třída: ptáci (Aves)
Podtřída: letci (Neognathae)
Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: datlovití (Picidae)
Rod: strakapoud (Dendrocopos)